

Prise en charge de l'adolescent séropositif

TUNISIE
HAMMAMET
du 28 sept.
au 30 2017

www.aframed2017.org

2^e édition
AFRAMED
VIH / HÉPATITES



Docteur Vincent JEANTILS

Unité Maladies Infectieuses, Hôpital Jean Verdier

Service Pr BOUCHAUD

Président de l'association ADOVIH

vincent.jeantils@aphp.fr



conclusion

- الحياة زين هم الأطفال
- اذن
- حمايتهم عليكم يجب



Transmission materno-foetale

La première consultation :

- ✓ Accueil spécifique
- ✓ Jeune seul
- ✓ Consultation longue
- ✓ Présentation des interlocuteurs de l'équipe
- ✓ Secret expliqué



Interrogatoire détaillé

- ✓ Fratrie
- ✓ Personne au courant
- ✓ Scolarité
- ✓ Toxiques à détailler
- ✓ État amoureux
- ✓ Rapports sexuels ou non
 - * si oui voulus ou non (hétéro, homo)
- ✓ Age 1^{er} rapport sexuel
- ✓ Pilule du lendemain, nombre de fois
- ✓ IVG
- ✓ Si fille, insister sur violences sexuelles



Médicalement

- ✓ Vaccin HPV
- ✓ Interdire les molécules à faible barrière génétique
- ✓ Ce n'est pas la simplification qui favorise la prise.
- ✓ 1^{ère} étape : accepter d'être malade
- ✓ Valeurs de l'environnement
- ✓ Place des aérosols de Pentacarinat, Fuzéon



Sexualité

CV <40, on se protège

Ce qui est différent de faire attention et protéger les autres



Connaître le jeune

- ✓ Ses révoltes
- ✓ Ses besoins
- ✓ Qui a annoncé,
- ✓ A quel âge,
- ✓ Comment
- ✓ Ses désirs
- ✓ Laisser exprimer le fait que le jeune en veut à l'adulte



Les soignants

- ✓ Etre formés
- ✓ Travailler en équipe : assistante sociale, IDE, psychologue, secrétaire, médecins
- ✓ Travailler avec les associations
- ✓ Deux sentiments fréquents :
 - l'impuissance
 - la lassitude
- ✓ Les connaître, en parler, savoir passer la main au sein d'une équipe.
- ✓ Savoir ne pas parler du virus pendant la consultation.
- ✓ Toujours garder une position d'adulte



Les transmissions sexuelles

- ✓ Plus facile à gérer
- ✓ Place du mode de contamination, témoin parfois d'un déséquilibre préexistant
- ✓ Violences sexuelles